

**第2類医薬品 発毛促進剤****ハツモール・内服錠**

60錠／180錠

- 抜け毛、薄毛の原因は遺伝、生活習慣、ストレス等 個々の体質により異なり、その治療法は多種多様です。

そのため、外用剤以外にも体内からの治療が必要です。

「ハツモール・内服錠」は脱毛症に対して効果のある生薬とビタミン等を有効成分とした医薬品で、毛乳頭内部の毛細血管の血行を促進し、栄養障害を改善して、体内から毛根部の障害を正常な状態によみがえらせることで発毛を促進します。

- 「ハツモール・内服錠」は<sup>ひこうせい</sup>糖性脱毛症の原因となる脂質分泌異常を正常にして、脱毛部の血行をよくする作用があります。

また、精神的なストレスや自律神経障害による円形脱毛症には内科的な精神安定を補助し、体内より栄養を補給し、皮下組織の栄養不足を改善して、発毛しやすい体質にします。

**⚠ 使用上の注意****してはいけないこと**

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないでください。
  - (1) 小児(15才未満)
  - (2) 適応症(脱毛症)以外の人

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
  - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
  - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状          |
|------|-------------|
| 皮膚   | 発赤、発疹、かゆみ   |
| 消化器系 | 悪心、嘔吐、下痢、腹痛 |

## 効能・効果

### ひこうせい※ 糖性脱毛症、円形脱毛症

※糖性脱毛症とは、皮脂の分泌異常により角質がはがれて出来るフケが原因となって引き起こされる脱毛症です。

## 用法・用量

成人1日6錠を水またはお湯で2～3回に分けて服用してください。

### ●用法・用量に関する注意

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



## 成分・分量 【6錠(成人の1日の服用量)中】

| 成分                 | 分量         | 働き                              |
|--------------------|------------|---------------------------------|
| カンゾウ末              | 500.202 mg | 炎症やアレルギーを抑える。                   |
| イノシトールヘキサニコチン酸エステル | 480 mg     | 末梢血管を拡張し、血行を良くする。               |
| セファランチン            | 0.015 mg   | 末梢血管拡張作用により毛成長を促進する。免疫機能を増強する。  |
| アリメマジン酒石酸塩         | 0.03 mg    | 抗ヒスタミン作用があり、かゆみを抑える。            |
| パントテン酸カルシウム        | 497.298 mg | 毛髪や皮膚の栄養状態を整える。                 |
| チアミン塩化物塩酸塩         | 2.49 mg    | 神経や筋肉の働きをよくする。糖質を分解してエネルギーに変える。 |
| リボフラビン             | 0.996 mg   | 皮膚、爪、毛髪の成長を促進する。                |
| ピリドキシン塩酸塩          | 2.49 mg    | 皮脂腺の働きを正常化し、過剰な皮脂の分泌を抑制する。      |
| アスコルビン酸            | 12.45 mg   | 血管、皮膚、粘膜、免疫力を強化する。活性酸素の害を防ぐ。    |
| ニコチン酸アミド           | 4.98 mg    | 血行を促進する。神経系に働き、ストレスを解消する。       |

添加物：乳糖水和物、バレイショデンプン、リン酸水素カルシウム水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースナトリウム、タルク、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロースフタル酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、酸化チタン、カルナウバロウ

## 保管及び取扱い上の注意

- 1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- 4) アルミピロー開封後はすみやかに服用してください。
- 5) 本剤は外装に記載されている使用期限内に服用してください。

## 包装

60錠(10錠×6) / 180錠(10錠×18)

アルミピロー包装品

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

株式会社 田村治照堂 お客様相談室

住所：〒546-0035 大阪市東住吉区山坂3-6-15

電話：06-6622-6482 受付時間：月～金曜日 9:00～17:00 (祝祭日を除く)