



飲みやすい小粒錠

Kracie

肌あれ。
いぼに。

ハトムギ専科

ヨクイニン
タブレット

生薬製剤

第3類医薬品

YOKUININ is for the treatment of
rough skin and warts.

✂切り取り線

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

この説明文は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

販売名:クラシエヨクイニンタブレット

第3類医薬品

チャック

⚠使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能】 いぼ、皮膚のあれ

【用法・用量】 1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	6錠	3回
15才未満7才以上	4錠	
7才未満4才以上	3錠	
4才未満3才以上	2錠	
3才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 3才以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

【成分】 成人1日の服用量18錠(1錠120mg)中

ヨクイニンエキス……1,500mg[ヨクイニン19.5gに相当]

添加物として、アメ、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(ヨクイニン)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることや、錠剤の表面に黒褐色の斑点が見られることがあります。また、ヨクイニン特有のにおいを感じる場合があります。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりとしめて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 水分が錠剤につきまると、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

発売元 **クラシエ 薬品株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03) 5446-3334
 受付時間10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **クラシエ 製薬株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

副作用被害救済制度の問合せ先

☎ 0120-149-931 04933