

のどの痛み・はれ

のどぬ〜る[®]

スプレー

キッズ[®]C

ウイルス・菌による

のどの痛み

患部に当たる
ロングノズル



いちご味



第3類医薬品



小林製薬

Throat Disinfectant **第3類医薬品**

口腔咽喉薬

販売名:のどぬーるスプレーキッズC
〔効能・効果〕のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ
〔用法・用量〕1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

(1)ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら噴射すること(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがある)(2)小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(4)のど用にのみ使用すること(5)薬液を誤って大量に飲み込んだときは、直ちに医師の診療を受けること

〔成分・分量〕 100mL中

ポビドンヨード……………0.45
添加物として、ヨウ化K、グリセリン、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、l-メントール、香料を含有する

火気厳禁 第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物 水溶性

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

⚠使用上の注意

⊗(してはいけないこと)

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1.次の方は使用しないこと (1)本剤又は本剤の成分、ポビドンヨード(ヨウ素)によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)甲状腺疾患のある人 (3)2才未満の乳幼児
- 2.長期連用しないこと 3.大量に噴射しないこと

相談すること

- 1.次の方は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)授乳中の人 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5)次の症状のある人:口内のひどいただれ
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

- 3.5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要に応じて読めるよう大切に保管してください。使用期限(パッケージ底面および容器ラベルに記載)を過ぎた製品は使用しないこと

〔保管および取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに、キャップをしっかりとめて立てて保管すること(2)小児の手の届かないところに保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)火気に近づけないこと(エタノール含有物)

●使用後は、必ずキャップをしてノズルをもとの位置にもどして保管すること●携帯する場合は、添付のビニール袋に入れること●使用中に薬液がこぼれ衣類などが着色したら、すぐに水洗いすること●液が出ないときは、液が出るまでくり返し押すこと。またノズルの先端を針などで突かないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

＼あったらいいな／をカタチにする

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎ **0120-5884-01**

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3