

2013年3月(記載要領変更に伴う改訂)

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(パッケージ底面および容器底面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

# 水虫・たむし用薬 NEW タムシチンキゴールド<sup>a</sup>

販売名:ニュータムシチンキゴールド a

第2類医薬品

## 特徴

- 1日1回で効く液体水虫薬
- 炎症を鎮めるグリチルレチン酸配合
- ハケ付で患部に塗りやすい
- しつこい白せん菌を殺菌するオキシコナゾール硝酸塩配合
- 刺激の少ない、やさしい使い心地

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣など)、陰のう、外陰部など
- (2) 湿疹 (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 乳幼児
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が顔面または広範囲の人
- (5) 患部が化膿している人
- (6) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人(陰のうにかゆみ、ただれなどの症状がある場合は、湿疹など他の原因による場合が多い)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、乾燥感、ヒリヒリ感

3. 2週間くらい使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

## 効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

## 用法・用量

1日1回、患部に適量を塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

(1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと

(2) 目に入らないように注意すること

万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること

(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること

(4) 外用にのみ使用すること

## 成分・分量 100mL中

成分	分量	はたらき
オキシコナゾール硝酸塩	1g	白せん菌を殺菌して、患部の治癒を促進する
クロタミトン	5g	みずむし、たむしに伴うかゆみを鎮める
リドカイン	2g	みずむし、たむしに伴うかゆみを鎮める
グリチルレチン酸	0.5g	炎症を鎮める
l-メントール	1g	清涼感を与えて、かゆみをやわらげる

添加物として、1,3-ブチレングリコール、プロピレングリコール、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、BHTを含有する

## 保管および取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること

(2) 小児の手の届かないところに保管すること

(3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）

(4) 火気に近づけないこと（エタノール含有物）

●使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用すること

●本剤は合成樹脂などを軟化したり、塗料を溶かすことがあるため、家具や床などにつかないようにすること

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします