

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

保湿チャック付

〈鎮痛消炎シップ剤〉

1枚あたり 10cm×14cm 膏体量7g

パテックス[®]うすびたシップ

鎮痛消炎薬

パテックスうすびたシップ

特 徴

超薄型で衣類にからみつきにくく、しかも膏体がスミまでついて
いるため、肌に密着してはがれにくいシップ剤です。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) しっしん、かぶれ、傷口



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、
直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者
に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この
外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、打撲、捻挫、骨折痛、しもやけ

使用法

そのまま、または適当な大きさに切り、表面のフィルムをはがし、1日1～2回
患部に貼付して下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- 使用法を厳守して下さい。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。

成分・分量(膏体100g中)

成 分	分 量	はたらき
サリチル酸グリコール	2g	炎症をおさえ、痛みをやわらげます。
l-メントール	1g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。
アルニカチンキ	1mL (原生薬として0.2g相当)	炎症をおさえ、痛みをやわらげます。

添加物：CMC-Na、ゼラチン、水酸化Al、グリセリン、pH調節剤、エドト酸Na、無水ケイ酸、
酸化チタン、その他2成分

[1枚あたり(10cm×14cm) 膏体量7g]

※本剤は生薬を配合しておりますので、色調が多少異なることもありますが、
効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が
変わります)
- 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちん
と閉めて保管して下さい。
- 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い致します。
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電 話 03(5205)8331
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

ニフロパッチ株式会社

埼玉県春日部市南栄町8番地1

製造番号

使用期限