

血中の余分な脂質をとる

# コレストン<sup>®</sup>

血清高コレステロール改善薬

## 商品の特長

- 「コレストン」は、血清高コレステロールを改善し、また、血清高コレステロールに伴う末梢血行障害(手足の冷え・しびれ)を緩和する医薬品です。
  - 大豆由来成分の「大豆油不けん化物」が腸管からの余分なコレステロールの吸収を抑制し、排泄を促します。
  - パンテチンは、肝臓におけるコレステロールの代謝を改善します。LDL(悪玉)コレステロールの分解を促し、またHDL(善玉)コレステロールを増加させ、血液中の余分なコレステロールをとり、血管壁への沈着を抑えます。
  - 天然型ビタミンE(酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール)は過酸化脂質の生成を抑え、血液をスムーズにし、末梢血行障害(手足の冷え・しびれ)を緩和します。
- 「コレストン」はこれら3つの有効成分の力により効果を発揮します。

高コレステロールは、自覚症状がなく、自分では気づきにくい症状です。  
本商品の服用後は定期的に医療機関でコレステロール値の測定をすることをお勧めします。

## ⚠️[使用上の注意]

### 🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、胃部不快感、胸やけ、食欲不振、腹痛
3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
下痢、軟便
4. 1ヶ月位服用しても症状・コレステロール値の改善がみられない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
(1ヶ月ほど服用後、医療機関でコレステロール値の測定をしてください。)
5. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。  
出血が長く続く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

**【効能・効果】** 血清高コレステロールの改善、血清高コレステロールに伴う末梢血行障害(手足の冷え・しびれ)の緩和

**【用法・用量】** 次の量を食後に水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 血清高コレステロールの改善には食事療法が大切なので、本剤を服用しても食事療法を行ってください。

**【成分・分量】** 成人1日量(6カプセル)中に次の成分を含んでいます。

成分	分量(6カプセル中)
パンテチン	375mg
大豆油不けん化物	600mg
酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール	100mg

添加物として、サフラワー油、ポリソルベート80、グリセリン、酸化チタン、サンセットイエローFCF、ゼラチン、D-ソルビトールを含んでいます。

#### **保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
また、服用のつどピンのフタをしっかり閉めてください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。

〈包装〉 42カプセル、84カプセル、168カプセル

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>

久光製薬お客様相談室：☎0120-133250 受付時間/9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

製造販売元 **東海カプセル株式会社** 〒419-0202 静岡県富士市久沢168番地