

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。 **眼科用薬**

疲れやすい大人の瞳に。

## 疲れをほぐし、凜とした瞳へ!

販売名:

ロートリセリッチプレミアム

ROHTO  
*Lycée*  
RICH PREMIUM

第2類医薬品 13mL

### ◆製品特徴

現代人の大人の瞳は、働き続ける。

エアコン、パソコン・スマートフォンの作業で、夕方になると瞳もどんより疲れが溜まる。

そんな頑張る大人の瞳にロートリセリッチプレミアム。

ダブルの疲れほぐし成分が、奥深くの疲れたピント調節筋に浸透。

さらに角膜トリートメント成分が瞳に行き渡り、角膜を保護し、疲れを癒します。

プレミアムな1滴で、凜とした瞳へ!

### ◆容器特徴

どの角度からでもさしやすい

フリー  
アングル  
ノズル®



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式  
スクリュー  
キャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も  
右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

### 使用上の注意 ⚠

#### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人: はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人: 緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合

### 用法・用量

1回1~2滴、1日3~6回点眼してください。

#### 用法・用量に関連する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたりかえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先と  
目やまつ毛が  
ふれることのないように



成分		
有効成分	配合量	はたらき
ビタミンB <sub>12</sub>	0.006%	毛様体筋のはたらきを活発にし、目の疲れを癒します。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	ピント調節機能を回復して、目の疲れを改善します。
塩酸テトラヒドロゾリン	0.05%	血管を収縮させて結膜(白目の部分)の充血を抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	ヒスタミンをブロックして目のかゆみを抑えます。
ビタミンB <sub>6</sub>	0.1%	ターンオーバー(組織代謝)を活発にし、疲れを癒します。
L-アスパラギン酸カリウム	1.0%	瞳細胞の呼吸促進を行い、疲れを癒します。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5%	角膜を保護・トリートメントし、疲れを癒します。

※添加物として、ホウ酸、ℓ-メントール、ゲラニオール、d-カンフル、ベルガモット油、ヒアルロン酸Na、クエン酸Na、クロロブタノール、ポリソルベート80、ヒプロメロース、クエン酸、pH調節剤

### 効能・効果

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| ○目の疲れ              | ○眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど) |
| ○結膜充血              | ○眼瞼炎(まぶたのただれ)                |
| ○目のかすみ(目やにの多いときなど) | ○紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)        |
| ○目のかゆみ             | ○ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感    |

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。  
品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。  
※有効成分のビタミンB<sub>12</sub>(ピンク色)は光にあると分解して退色します。  
使用後は必ずキャップをしっかり閉めて、日光や蛍光灯などに当たらないようにして保管してください。
- キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 他の人と共用しないでください。
- 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。  
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、保管及び取扱い上の注意に従い、1~2ヶ月を目安にご使用ください。
- 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- 容器に他の物を入れて使用しないでください。



### お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

**東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230**

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)