



服用前にこの説明書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう保管して下さい。
販売名:スラーリア便秘内服液 **瀉下薬**

スラーリア
slaria[®]


第3類医薬品

WASH OUT WATER
I Promise You to Reset Inner Body.
Say Good-Bye to Constipation,
Hello to Refreshing Body & Smooth Skin.

WATER CONTROL

ウォーターコントロール[®]とは・・・。

ミネラルのはたらきで腸内に水分を移行させるしくみのこと。
水のチカラを利用して、やわらかくした便を洗い出すというメカニズムなので、スムーズな排出実感が期待できます。



肌あれにより
ビタミンB6配合



GRAPEFRUIT FLAVOR


スッキリ飲みやすいグレープフルーツ味。
冷やして飲むと、より飲みやすくなります。

STEP1
マグネシウムが浸透圧をUP

STEP2
腸内に水分が移行してくる

STEP3
便を洗い出してスッキリ!

ウォーターコネクト力[®](水分誘引力)を高める工夫がされた処方設計です。洗い出す力が高い処方ですが、効き目の強さはご自分の症状の程度にあわせて調節いただくことができます。



⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ☒

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
他の瀉下薬(下剤)

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 次の症状のある人
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
 - (4) 次の診断を受けた人 腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

関係部位	症状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。
下痢

4. 1週間位服用しても症状がよくなりなない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

効能・効果

○便秘 ○便秘に伴う次の症状の緩和:肌あれ、吹出物、腹部膨満、食欲不振(食欲減退)、腸内異常醗酵、頭重、のぼせ、痔

有効成分 100mL中

有効成分	配合量	作用
硫酸マグネシウム水和物	5000mg	腸管に水分を移行させます
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	5mg	肌あれや吹出物に効果的です
添加物:リボフラビンリン酸エステルNa(ビタミンB2リン酸エステル)、デキストリン、グリセリン、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na水和物、安息香酸Na、エタノール、パラベン、香料		

用法・用量

次の量を空腹時に服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	50~100mL	1回
15才未満	服用しないこと	

初回は最小量の50mLでお試し下さい。その後、便通の具合や状態を見ながら少しずつ増量又は減量して下さい。 ※必ず添付の目盛付きカップで計ってお飲み下さい。

(用法・用量に関連する注意)


(1)用法・用量を厳守して下さい。

(2)目盛付きカップは、ご使用のつど水洗い等して常に清潔に保管して下さい。

スッキリ体感チャート

※このチャートの服用量はあくまでも目安量です。

最小量から、段階的に用量を増やしてご自分に合った服用量を見つけて下さい。



飲み方のアドバイス

どんな症状に?

おなかのぼっこりが気になる、吹き出物が出てきた、おなかの苦しくて食欲も出ないなど、便秘による悪いサイクルから抜け出したいときにお使い下さい。

どんな場面で?

はやい方は約1~2時間で効果があらわれるなど、そのあらわれかたにも個人差がありますので、お手洗いにに行ける状態(自宅など)でのご使用をおすすめします。

どのくらいの量?

まずは最小量の50mLからはじめ、症状に合わせて20~30mLずつ増やすなどして、ご自分にあったスッキリできる量を見つけて下さい。上記の「スッキリ体感チャート」をご参考下さい。

効果的な飲み方は?

ウォーターコントロール作用には水のはたらきが関わっていますので、服用後に水又はお湯を飲むとより効果的です。また、必ず空腹時に服用して下さい。服用後しばらく(30分以上)は食事を控えることをおすすめします。

効果的な時間帯は?

本品は空腹時に服用する必要があります。例えば、朝起きてすぐ(前回の食事からの時間が一番長いと思われ、腸の活動が始まる)の服用などをおすすめします。

服用後におなかが鳴る?

薬液が腸に届いて腸が動き出したサインと思われれます。その結果、腸に水や空気が送りこまれ、まれにおなかが張ることがありますが、この症状は排便とともに改善されます。

保管及び取扱上の注意

(1)光(日光や室内灯など)の当たらない涼しいところに密栓して保管して下さい。

(2)小児の手の届かないところに保管して下さい。

(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる)

(4)使用期限(外箱・ラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないで下さい。

なお、使用期限内であっても一度開封した後は冷蔵庫に保管し、3ヶ月以内にご使用下さい。

ただし、混濁等異常が見られた場合は使用しないで下さい。

(5)落下すると危険ですので、お取り扱いの際には瓶本体をお持ち下さい。

(6)瓶はワレモノです。凍らせないで下さい。

If you want more information, access to...

<http://www.slaria.com/>

スラーリアドットコムにて、詳しい情報を公開中!

飲み方などを含め、製品についてのご質問は右記のサポートデスクまでお気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、また、ご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020

大阪:06-6758-1230

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)